

Oleksandr Poliszczuk, Oksana Penderecka

Cechy osobowości i aktualny stan psychoemocjonalny pacjentów z zawałem mięśnia sercowego

Personality traits and current psycho-emotional condition of patients with myocardial infraction

Bukowynski Derzhawnyi Medychnyi Uniwersytet - Ukraina

W Ukrainie w ciągu ostatnich lat zauważono wzrost zachorowalności, niepełnosprawności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia. Na podstawie przeglądu współczesnych badań poszukiwano związków między ryzykiem zawału mięśnia sercowego i czynnikami psychospołecznymi (stres, depresja, typ zachowania i tym podobne). Celem pracy było wyznaczenie psychologicznych właściwości osobowości jednostki, które przyczyniają się do rozwoju zawału mięśnia sercowego.

Zbadano 90 chorych z diagnozą ostrego zawału mięśnia sercowego, leczonych stacjonarnie w przyszpitalnej przychodni kardiologicznej w Czerniowcach. Za pomocą metody Ch.Spilbergera ustalono poziom osobowości i sytuacji lękowej, za pomocą TAS - poziom aleksytymii. Ustalono, że wśród chorych na zawał mięśnia sercowego większość stanowią osoby z wysokim poziomem osobowości lękowej (61,11%), pozostałą część stanowili pacjenci ze średnim poziomem osobowości lękowej (38,89%), wśród badanych nie było osób o niskim poziomie osobowości lękowej. Wśród mężczyzn było 48 % osób z wysokim poziomem osobo-

wości lękowej i 52% ze średnim poziomem. Wśród kobiet 77,5 % stanowiły osoby z wysokim poziomem osobowości lękowej i 22,5% ze średnim poziomem. Wśród zbadanych osób 52% mężczyzn i 25% kobiet ujawniało cechy aleksytymii. Ustalono, że wysoki poziom osobowości lękowej jest bardziej charakterystyczny dla kobiet. Dla mężczyzn większe znaczenie ma sytuacja lękowa i aleksytymia.

Kt482@ukr.net